

I. Introduction

Les différents modèles mathématiques construits pour étudier les phénomènes où intervient le hasard sont basés sur la notion de probabilité. Celle-ci exige des *dénombrements d'ensembles finis*. C'est l'objet d'étude de *l'analyse combinatoire*.

Toute suite d'éléments choisis parmi les éléments d'un ensemble fini peut être *ordonnée ou non*, selon que l'on tient compte ou non de la position occupée par les éléments. D'autre part, la suite peut être *avec ou sans répétitions*, selon qu'un même élément puisse être utilisé plusieurs ou une seule fois.

exemples

- Si on jette un dé, combien de résultats distincts sont-ils possibles ?
- Combien y a-t-il de « mains » différentes au poker ?
- Combien peut-on former d'anagrammes du mot « Analyse » ?
- De combien de façons peut-on choisir 4 personnes parmi 17 ?
- Combien existe-t-il de nombres compris entre 100 et 100'000 commençant par un chiffre impair et contenant des chiffres différents ?

II. Notation factorielle

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Le nombre $n!$ se lit « *n factorielle* ».

On convient que $0! = 1$ (justification : c.f. chapitre V.)

exemples

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$50! = 50 \cdot 49 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cong 3,04140932 \cdot 10^{64}$$

exercices

II.1) $7! =$

II.2) $\frac{10!}{8!} =$

II.3) $\frac{10!}{3! \cdot 7!} =$

vrai ou faux ?

II.4) $n! = n \cdot (n-1)!$

II.5) $\frac{72!}{70!}$ n'existe pas

III. Arrangements sans répétitions

exemple III.1

Soient ♠ ♥ ♦ ♣ quatre objets. Les arrangements sans répétitions de ces 4 objets pris 2 à la fois sont :

♠ ♥	♠ ♦	♠ ♣	♥ ♠	♥ ♦	♥ ♣
♦ ♠	♦ ♥	♦ ♣	♣ ♠	♣ ♥	♣ ♦

exemple III.2

Combien de mots fictifs peut-on écrire avec 3 lettres distinctes choisies parmi les lettres *CH I E N* ?

Définition et formule

On dispose de n objets distincts. Un **arrangement sans répétitions** de n objets pris k à la fois, est une manière de choisir k ($k \leq n$) objets parmi n . **L'ordre compte.**

Le nombre d'arrangements sans répétitions de n objets pris k à la fois, est noté A_k^n , et vaut :

$$A_k^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

explication

Il y a n choix pour le 1^{er} objet, $n-1$ pour le 2^{ème}, $n-2$ pour le 3^{ème}, ..., $n-k+1$ pour le k ^{ème}.

remarque

Deux arrangements distincts diffèrent par l'ordre **ou** par la nature des objets les composant.

exercice III.1 : Calculez le nombre de tiercés possibles lorsque 18 chevaux prennent le départ.

exercice III.2 : De combien de manières différentes peut-on élire un président et un vice-président parmi 10 personnes ?

IV. Arrangements avec répétitions

exemple IV.1

Soient \triangle ☀ \textcircled{P} trois objets. Les arrangements avec répétitions de ces 3 objets pris 2 à la fois sont :

$\triangle \triangle$	$\triangle \textcircled{P}$	$\triangle \textcircled{P}$	☀ \triangle	☀ ☀	☀ \textcircled{P}	$\textcircled{P} \triangle$	$\textcircled{P} \textcircled{P}$	$\textcircled{P} \textcircled{P}$
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	---------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

exemple IV.2

Combien de mots fictifs peut-on écrire avec 3 lettres parmi les lettres *CHIEN* ?

Définition et formule

On dispose de n objets distincts. Un **arrangement avec répétitions** de n objets pris k à la fois, est une manière de choisir k objets parmi ces n objets, le même objet pouvant être pris plusieurs fois.

L'ordre compte.

Le nombre d'arrangements avec répétitions de n objets pris k à la fois, est noté \overline{A}_k^n , et vaut :

$$\overline{A}_k^n = n^k$$

explication




Il y a n choix pour le 1^{er} objet, n pour le 2^{ème}, n pour le 3^{ème}, ..., n pour le k ^{ème}.

exercice IV.1 : Combien de séries différentes peut-on obtenir en jouant à « pile ou face » 7 fois ?

exercice IV.4 : Combien de séquences peut-on lire sur un compteur de voitures ? Ce compteur est composé de 5 cylindres sur chacun desquels sont gravés les chiffres de 0 à 9.

V. Permutations sans répétitions

exemple V.1

Soient    trois objets. Les permutations de ces 3 objets sont :



exemple V.2

Combien de mots fictifs peut-on écrire en utilisant exactement une fois chaque lettre du mot « *CHIEN* » ?

Définition et formule

On dispose de n objets distincts. Une **permutation** de n objets est un arrangement sans répétitions de **tous** ces n objets.

Le nombre de permutations de n objets est noté P_n , et vaut :

$$P_n = A_n^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

explication

Il y a n choix pour le 1^{er} objet, $n-1$ pour le 2^{ème}, 2 pour l'avant dernier et 1 pour le dernier.

remarque

Deux permutations distinctes ne diffèrent que par l'ordre des objets les composant.

question

La formule $A_n^n = n!$ justifie la convention $0! = 1$. Pourquoi ?



exercice V.1 : De combien de façons différentes peut-on ranger 4 mouchoirs différents dans 4 tiroirs, en plaçant un mouchoir par tiroir ?

exercice V.2 : Combien y a-t-il de possibilités d'aligner 20 élèves ?
A raison de 10 secondes par permutations, combien de temps faudrait-il pour épuiser toutes les possibilités ?

VI. Permutations avec répétitions

exemple VI.1 : Soient  et  cinq objets.

Dans cet exemple, il y a $p = 2$ sortes d'objets, $n_1 = 3$ et $n_2 = 2$. Les permutations avec répétitions sont :

Définition et formule

On dispose de n objets. Parmi ces n objets il y a p sortes différentes. On suppose qu'il y a : n_1 objets de sorte 1, n_2 objets de sorte 2, ..., n_p objets de sorte p , où $n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$.

Une **permutation avec répétition** de ces n objets est une permutation de ces n objets, dans laquelle on ne distingue pas les objets d'une même sorte.

Le nombre de permutations avec répétitions de $n = n_1 + n_2 + \dots + n_p$ objets est :

$$\bar{P}(n_1, n_2, \dots, n_p) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_p!}$$

explication

Il y a $n!$ permutations possibles de ces n objets, parmi lesquelles il y a $n_1!$ permutations des objets de la première sorte, qu'on ne distingue pas, il y a $n_2!$ permutations des objets de la deuxième sorte, qu'on ne distingue pas, etc.

Dans les $n!$ permutations des objets, on en compte $n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_p!$ fois trop.

exercice VI.1 : Combien de mots fictifs peut-on écrire avec les lettres du mot « LILLE » ?

exercice VI.2 : De combien de façons peut-on aligner 2 livres rouges, 5 livres verts et 1 livre blanc sur une étagère ? (Seule la couleur différencie les livres !)

VII. Combinaisons sans répétitions

exemple VII.1








Soient      cinq objets.

Les combinaisons sans répétitions de 5 objets pris 3 à la fois sont :

Il y a donc 10 manières de choisir 3 éléments parmi 5, *l'ordre n'important pas*.

A chacune de ces combinaisons correspond $3! = 6$ arrangements possibles :

conséquence

Il y a donc $3!$ fois moins de combinaisons de 5 objets pris 3 à la fois, que d'arrangements de 5 objets pris 3 à la fois.

exemple VII.2

Combien peut-on former d'ensembles de 3 lettres différentes parmi les lettres *CH I E N*?

Définition et formule

On dispose de n objets distincts. Une **combinaison sans répétitions** de n objets pris k à la fois, est un choix de k ($k \leq n$) objets parmi n . **L'ordre ne compte pas**.

Le nombre de combinaisons sans répétitions de n objets pris k à la fois, est noté C_k^n , et vaut :

$$C_k^n = \frac{A_k^n}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

remarque

Deux combinaisons distinctes diffèrent par la nature des objets les composant, mais pas par l'ordre.

exercice VII.1 : Combien de glaces distinctes avec 3 parfums différents peut-on faire avec 8 parfums ?

On peut définir des *combinaisons avec répétitions*, mais nous ne le ferons pas.